

#### AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

N° 8 C du 05/05/1994

**GRANDES CULTURES N° 3** 

**COLZA** R.A.S.

POIS Traitement de couverture floraison

(Fongicide + Insecticide)

Traitement de couverture épiaison ORGE

(Fongicide)

Le point sur l'état sanitaire BLE

stratégie et conduite à tenir

Porte-graines LUZERNE

Traitement insecticide

# POIS PROTEAGINEUX

#### Stade début à pleine floraison

MILDIOU: nous n'avons pas observé cette maladie; présente pendant quelques années elle semble avoir disparue, cependant les conditions climatiques actuelles seraient favorables, observez régulièrement vos cultures.

ANTHRACNOSE: (plusieurs champignons possibles) également absente pour le moment; il convient cependant de préserver le bon état sanitaire actuel sur des cultures assez peu denses dans l'ensemble.

La couverture fongicide doit tenir compte d'un risque toujours possible de développement de BOTRYTIS au moment de la chute des pièces florales.

PUCERONS: ces ravageurs peuvent être observés et il faut éviter le développement des colonies.



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX ZAC D'ALCO B.P.3056 34034 MONTPELLIER CEDEX 01 Tél: 67.10.19.50

PUBLICATION PÉRIODIQUE IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F. C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

BRUCHES: Ces charançons sont très discrets et difficilement observables; ils sont actifs au moment des périodes les plus chaudes et il faut les éliminer des cultures; leur présence se manifeste ensuite dans les grains stockés, dépréciant leur valeur alimentaire.

A la pleine floraison procédez à un traitement de couverture à l'aide d'une des solutions suivantes :

Fongicides: ERIA 2 L/HA

PELTAR FLO 5 L BRAVO PLUS 2 L

CICERO ou IMPACT TX 2 L

Insecticides: KARATE 0.125L

BAYTHROID 0.6 L TALSTAR 0.2 L

# ORGES DE BRASSERIE

#### Cultures à l'épiaison

Dans notre dernière édition nous vous avions signalé la présence de Rouille naine et de Rhynchosporiose et nous vous avions conseillé de protéger vos cultures.

La ROUILLE NAINE marque le pas, par contre la RHYNCHOSPORIOSE est très présente.

Lorsque vos cultures seront à la pleine épiaison (tous les épis sortis stades 10-3 à 10-5) traitez à l'aide d'une des spécialités suivantes :

OPUS 1 L/HA
HORIZON 1 L
LIBERO 1,5 L

# BLES

ROUILLE BRUNE : On peut constater un ralentissement bien marqué surtout sur les parcelles qui ont été protégées selon notre conseil du 14 Avril dernier; la pression de la maladie est fonction de la densité de la culture, de la protection qu'elle a ou non reçue et de la variété.

- \* si vous n'avez pas encore traité (notre conseil du 14/04) vous ne pouvez pas attendre l'épiaison vous devez protéger vos cultures dès réception si la rouille brune est bien présente (observez vos parcelles)
- \* vous avez traité il y a 3 semaines ou plus c'est à dire avant la parution de notre conseil, vous ne pouvez pas non plus attendre l'épiaison, il faut protéger à nouveau vos blés dès réception.

Pour ces 2 cas les spécialités conseillées dans notre édition précédente sont à utiliser :

SPOT 1.5 L/HA

OPUS 1 L

\* pour les parcelles normalement protégées à la suite de notre avis, attendre l'épiaison, le but de la stratégie 2 traitements pas plus sera atteint.

Les spécialités HORIZON, LIBERO et CARAMBA sont à réserver pour le traitement épiaison.

OIDIUM: présent sur certaines variétés comme Brindur, ne pas s'inquiéter pour l'instant.

SEPTORIOSE: en régression

**PUCERONS**: on peut observer la présence de ces ravageurs qui ne sont pas nuisibles pour le moment; le prochain bulletin qui paraîtra au moment de l'épiaison fera le point sur ce problème.

"JAUNISSEMENTS" : certaines variétés comme IXOS manifestent des jaunissements plus ou moins importants dont la cause est physiologique.

Note des techniciens de la Chambre d'agriculture et des Coopératives : ces techniciens vous rappellent qu'il faut procéder au dernier apport d'azote (qualité - mitadinage)

# LUZERNES

Les Luzernes porte-graines ont été très attaquées par les APIONS et les PHYTONOMES.

- \* vous allez faire une précoupe, ne traitez pas maintenant, et protégez vos parcelles dès la reprise de végétation.
- \* vous ne faites pas de précoupe et vous n'avez pas traité (contraintes climatiques, priorités de travail) intervenez si possible dès réception et utilisez une des spécialités suivantes :

MAVRIK KARATE	0.2 0.15	L/HA L
FASTAC	0.3	$\mathbf{L}$

# TOURNESOL


Comme tous les ans nous assurons le suivi biologique du PHOMOPSIS, vous serez tenus régulièrement informés de l'évolution éventuelle du risque.

Pour tout problème particulier consultez votre technicien de secteur, de coopérative ou nous-mêmes au 68-71-18-58 (Fax : 68-47-46-45)



# BLÉ : MALADIES DU FEUILLAGE

#### Septoria tritici



Points noirs (pycnides) visibles à l'oeil nu

### Rouille jaune



Pustules alignées en stries parallèles aux nervures

Début d'attaque

# Septorioses

#### Septoria nodorum



Taches losangiques à marge jaunâtre (chlorotique)

# Rouilles


#### Rouille brune



Début d'attaque ; pustules arrondies, dispersées


## **O**ïdium

## Sur feuilles... mais aussi sur tige




Attaque ancienne

#### Septoria nodorum




Pycnides visibles à la loupe

#### Rouille brune



Pustule vue à la loupe



Attaque sur tige